

令和4年度 インフルエンザワクチン定期予防接種のお知らせ

このお知らせをよくご覧になり、ワクチンの効果や副反応等をご理解の上、接種を希望する方は下記の接種期間中で体調の良い時に受けてください。

1 接種対象者	接種日時時点でさいたま市に住民登録があり、次の(1)(2)のいずれかに該当する方 (1) 65歳以上の方 (2) 60歳以上65歳未満で、厚生労働省令で定める、心臓、腎臓若しくは呼吸器等の機能に極度（身体障害者手帳1級相当）の障害を有する方 ※確認できる身体障害者手帳または診断書等を接種医療機関にご持参ください
2 接種場所	さいたま市定期予防接種実施医療機関（事前予約） ※市内実施医療機関以外を希望する場合、 <u>事前に</u> 各区役所保健センターへご相談ください。
3 接種回数	1回 （市の助成は、「4 接種期間」内に1度限りです）
4 接種期間	令和4年10月1日(土)から令和5年1月31日(火)まで ※インフルエンザが流行期に入る前（12月中旬頃まで）に接種を受けることをお勧めします。
5 個人負担金 医療機関の窓口にお支払ください。	1,600円（税込） ※次の(1)～(3)のいずれかに該当する方は、 <u>事前に証明書類を医療機関の窓口</u> に提示することで 個人負担金が免除 されます。ただし、 <u>接種後の個人負担金の返金はできません</u> 。 (1) 生活保護世帯の方…生活保護受給証 (2) 中国残留邦人等支援給付制度の受給者の方…本人確認証 (3) 市民税非課税世帯（ <u>世帯全員が非課税</u> ）の方…次の①②③のいずれか ①「介護保険料決定通知書」または「介護保険料納入通知書」 ※市民税課税区分欄が“世帯非課税”となっているものに限ります。 ②「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」 ※「後期高齢者医療限度額適用認定証」では個人負担金は免除できません。 ③「無料券」 各区役所の保健センターで交付します。 接種前に必ず申請が必要です 。 申請時には、申請者の保険証等本人確認書類をお持ちください。 ※ <u>接種後の無料券の申請は認められません</u> 。また、交付後はすみやかに接種してください。 ※本人、同居親族、後見人等以外の方が申請する場合、委任状をご持参ください。委任状は、委任する方が署名（自署）する場合、ご押印不要です。記名する場合は、ご押印ください。 ※本人または同一世帯の方が、令和4年1月1日時点でさいたま市に住民登録がない場合は、事前に保健センターへご相談ください。

◎上記1～4を満たしていない場合は、接種料金は全額自己負担となります。

6 接種の際に持参する物

(1) 予防接種予診票…さいたま市定期予防接種実施医療機関で事前にお受け取りください。

なお、さいたま市と契約している市外（県内）の医療機関で接種希望の方は、必ず窓口に来られる方の本人確認書類をご持参の上、事前に各区役所の保健センターでお受け取りください。

次ページもご覧ください☞

- (2) 健康保険証…国民健康保険証、後期高齢者医療被保険者証 など
- (3) 本人確認書類…運転免許証や介護保険証、住民基本台帳カードなど、本人確認できるもの。
※国民健康保険証、後期高齢者医療被保険者証を持参の方は不要
- (4) 個人負担金…上記「5 個人負担金」のとおり

7 接種の同意について

インフルエンザ定期予防接種は、接種を受ける法律上の義務はなく、ご本人が希望する場合に限り、予防接種法に基づく接種を行うことができます。ご本人の意思が確認できない場合は、予防接種法に基づく接種を行うことができません。

認知症等により正確な意志の確認がしにくい場合には、家族やかかりつけ医によって、特に慎重にご本人の接種意思を確認してください（最終的にご本人の意思が確認できない場合は、予防接種法に基づく接種は行えません）。

8 予診票記入時の注意

- (1) 接種当日は体調をよく確認の上、太枠部分をボールペンで正確に記入してください。
- (2) 「診察前の体温」の箇所は、医療機関で記入してください。
- (3) 医師の診察の結果、接種が可能と判断された場合、予診票下部の「インフルエンザ定期予防接種希望書」の（接種を希望します・接種を希望しません）のいずれかに○を記入し、接種を希望する場合は接種日の日付を記入し、被接種者本人が署名してください。
- (4) 接種を受けるご本人に麻痺等があって同意書に署名ができない場合の代筆者は、家族・後見人（保佐人・補助人含む）に限ります。他の方が代筆する場合は、被接種者、家族または後見人が記載した、「代理人へ代筆を委任する」旨の委任状が必要です。この委任状を予診票に添付してください。

9 予防接種料交付金交付制度について

老人保健施設に入所している接種対象者等、実施医療機関で接種を受けることが困難な場合、費用から個人負担金を控除した額を交付する制度です。上限額の範囲で交付します。

なお、接種前に必ず各区役所の保健センターでの手続きが必要です。

インフルエンザとワクチンについて

1 インフルエンザとは

インフルエンザウイルスに感染することによって起こります。インフルエンザにかかった人が咳やくしゃみなどをすることにより、ウイルスが空気中に拡がり、それを吸い込むことによって感染します。

インフルエンザの流行は、通常、初冬から春先にみられますが、ときに春期、夏期にもみられます。
典型的なインフルエンザの症状は、突然の高熱・頭痛・関節痛・筋肉痛などで、のどの痛み、咳、鼻水などもみられます。普通の風邪に比べて全身症状が強いのが特徴です。気管支炎や肺炎などを合併し、重症化することが多いのもインフルエンザの特徴です。

また、インフルエンザは流行が始まると、短期間に小児から高齢者まで膨大な数の人を巻き込むという点でも普通の風邪とは異なります。さらに、普通の風邪が流行しても死亡する人はあまり増えませんが、インフルエンザが流行すると、特に65歳以上の高齢者や慢性疾患患者で死亡率が高くなります。

2 インフルエンザの予防

予防の基本は、流行前に予防接種を受けることです。これは、世界的にも認められている最も有効な予防法です。インフルエンザは空気中に拡散されたウイルスによって感染しますので、感染予防のために、人混みは避けましょう。また、常日ごろから十分な栄養や休養をとることも大切です。インフルエンザ感染の広がりには空気の乾燥が関連しています。室内では加湿器などを上手に使うことで適正な湿度（50～60%）を保ちましょう。外出時のマスクや帰宅時のうがい、手洗いは、普通の風邪の予防と併せておすすめします。

3 インフルエンザ予防接種の有効性

インフルエンザワクチンでは、インフルエンザ感染や発症そのものを完全には予防できませんが、重症化や合併症の発生を予防する効果は証明されています。高齢者がワクチンを接種することで、接種しなかった場合に比べて、死亡の危険を約5分の1に、入院の危険を約3分の1から2分の1にまで減少させることが期待できます。

なお、接種を受けてからインフルエンザに対する抵抗力がつくまでに2～4週間程度かかり、その効果が十分に持続する期間は約5か月とされています。より効果的に有効性を高めるには、毎年インフルエンザが流行する前の12月中旬ごろを目安に接種を受け終わっておくことが必要です。

4 インフルエンザワクチンの副反応

接種をした部位が、赤みを帯びたり、腫れたり、痛んだりすることがありますが、通常2～3日のうちに治ります。また、全身性の反応として、僅かながら熱が出たり、寒気がしたり、頭痛、全身の怠さなどがみられることもあります。通常2～3日の内に治ります。

また、まれに接種直後から数日中に、過敏症として発疹、じんましん、紅斑、掻痒感などがあります。非常にまれですが、ショック、呼吸困難などがあらわれることがあります。

4ページの「6 その他」の(2)(3)もご覧ください。

5 予防接種を受ける前に

(1) 一般的注意

このお知らせをよくご覧になり、ワクチンの効果、副反応及び予防接種健康被害救済制度についてよく理解しましょう。気にかかることや分からないことがあれば、予防接種を受ける前に担当の医師や看護師、各区役所の保健センターに質問しましょう。十分に納得できない場合には、接種を受けることはできません。(下記、〈注意〉を参照)

予診票は接種をする医師にとって、予防接種の可否を決める大切な情報です。基本的には、接種を受けるご本人が責任をもって記入し、正しい情報を接種医に伝えてください。

〈注意〉インフォームドコンセント（説明と同意）

予防接種法に基づくインフルエンザ定期予防接種は、あくまでも、ご本人の意思に基づいて接種を受けるものなので、医師の十分な説明に基づく患者の同意（インフォームドコンセント）がない場合には、医師は接種を行いません。接種を希望する場合もしない場合も、十分に医師から説明を受け、理解した上で判断をしてください。

(2) 新型コロナワクチンとの接種間隔

新型コロナワクチンとインフルエンザワクチンとの接種間隔につきましては、さいたま市ホームページをご覧ください。

(3) 予防接種を受けることができない方

① 接種当日に明らかな発熱のある方

一般的に、体温が37.5℃以上の場合を指します。

② 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな方

急性の病気で薬を飲む必要があるような方は、その後の病気の変化が分からなくなる可能性もあるので、その日は接種を見合わせるのが原則です。

③ インフルエンザワクチンに含まれる成分によって、アナフィラキシーを起こしたことがある方

アナフィラキシーとは通常接種後約30分以内に起こるひどいアレルギー反応のことです。発汗、顔が急に腫れる、全身にひどいじんましんが出る、吐き気、嘔吐、声が出にくい、息が苦しいなどの症状に続き、血圧が下がっていく激しい全身症状です。

④ 予防接種で接種後2日以内に発熱のみられた方及び全身性発疹等のアレルギーを疑う症状を起こしたことがある方

予防接種法上求められる安全性の確保及び健康被害を極力回避するためです。

⑤ その他、医師が不適当な状態と判断した場合

上の①～④に該当しなくても医師が接種不適当と判断した時は接種できません。

(4) 予防接種を受けるに際し、担当医師とよく相談しなくてはならない方

- ① 心臓病、腎臓病、肝臓病や血液、その他慢性の病気等を有している方
- ② 今までにけいれんを起こしたことがある方
- ③ 今までにぜん息と診断されたことがある方
- ④ インフルエンザワクチンの成分又は鶏卵、鶏肉、その他の鶏由来のものに対してアレルギーがあるとされたことがある方

(5) 予防接種を受けた後の一般的注意事項

- ① 接種を受けた後 30 分間は、急な副反応が起こることがあります。医師（医療機関）とすぐに連絡を取れるようにしておきましょう。
- ② インフルエンザワクチンの副反応の多くは 24 時間以内に出現しますので、特にこの間は体調に注意しましょう。
- ③ 入浴は差し支えありませんが、接種した部位を強くこすることはやめましょう。
- ④ 接種当日はいつもの生活をしてかまいませんが、激しい運動や大量の飲酒は避けましょう。
- ⑤ 1 ページ「1～4」を満たしていない場合は、接種料金は全額自己負担となり、接種後に医療機関に料金を支払っていただきます。

6 その他

(1) 予防接種を受けない場合

接種医の説明を十分聞いた上で、ご本人が接種を希望しない場合や、家族やかかりつけ医の協力を得てもご本人の意思の確認ができなかったため接種をしなかった場合、また当日の身体状況等により接種をしなかった場合等においては、その後、インフルエンザに「り患」あるいは「り患」したことによる重症化、死亡した場合も、担当した医師にその責任を求めることはできません。

(2) 副反応が起こった場合

接種後、まれに副反応が起こることがあります。また、接種と同時に、ほかの病気がたまたま重なって現れることがあります。

接種を受けた後、接種した部位が痛みや熱をもってひどく腫れたり、全身のじんましん、繰り返す嘔吐、顔色が悪い、低血圧、高熱等が現れたら、医師（医療機関）の診療を受けてください。

(3) 予防接種健康被害救済制度について

接種を受けたワクチンの種類によっては、けいれん、肝機能障害及び急性散在性脳脊髄炎等の健康被害が生じることがあります。このような健康被害を、厚生労働大臣が、予防接種法に基づく定期の予防接種による副反応であると認定した場合は、市町村が健康被害救済に関する給付を行う制度があります。

◆◆不明な点や心配なことは、各区役所の保健センターへお問い合わせください◆◆

(午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分 土・日・祝日・年末年始は除く)

西 区役所保健センター TEL 620-2700 FAX 620-2769

桜 区役所保健センター TEL 856-6200 FAX 856-6279

北 区役所保健センター TEL 669-6100 FAX 669-6169

浦和区役所保健センター TEL 824-3971 FAX 825-7405

大宮区役所保健センター TEL 646-3100 FAX 646-3169

南 区役所保健センター TEL 844-7200 FAX 844-7279

見沼区役所保健センター TEL 681-6100 FAX 681-6169

緑 区役所保健センター TEL 712-1200 FAX 712-1279

中央区役所保健センター TEL 840-6111 FAX 840-6115

岩槻区役所保健センター TEL 790-0222 FAX 790-0259